III. *Partium Genitalium in Muliere Structura præternaturalis. Ex Epistola Viri Doctissimi* Johannis Huxham, *M. D. ad* Jacobum Jurin, *R. S. Secr.*

Plimutho, v° *Kalend. Octob.* 1723.

A. B. De parochia *Lanteglass* in Comit. *Cornubiæ*, prope *Fowye* oppidum, annos nata XXIII nupta fuit cuidam Nautæ robusto, tandemque prægnans, sibi partium male conformatarum conscia, opem imploravit chirurgicam. Sibi accersitum esse voluit Dominum *Bonnett* de *Fowye* oppido, & artis chirurgicæ, & obstetriciæ peritissimum. Ille vero perspecto denudato corpore sequentia observavit.

Loco umbilici, in medio abdomine, paululum vero inferius, prominet massa quædam spongiosa, carnis quasi offam præ se ferens, abdomini transverse incumbens, magnitudinis fere ovi gallinacei, longa autem tres digitos: ex hac duo erumpunt meatus urinarii exiles, qui urinam perpetim exstillant, quam neque vel retinere vel ejaculare potest; hinc vesicam, (si quæ adsit) sphinctere caruisse concludendum. Spongiosa hæc mollisque massa, urinæ acrimonia corrosa, tactum fere refugit mollissimum, adeo ut incurvata obambulare coacta sit, ad dolorem a vestibus impressum evitandum, eamque tenuissimis linteis involvere. Hanc quidem massam funem fuisse umbilicalem male a partu abscissum, male dein curatum, existimo; ne vel minima enim umbilici, nisi hic, apparent vestigia; quid quod & urina per urachum pervium, & in duos

forsan

forſan tubulos diviſum, vel ſaltem per canales duos proprios, effluit. Priori potius credo opinioni; quia dantur Hiſtoriæ urinam per umbilicum in adultis etiam excretam fuiſſe atteſtantes. *Vid. Hiſt. de l'Academie Royale des Sciences, Ann.* 1701.

Hanc infra offam ſubintrat Vaginæ foramen, ab offa diſtans breviſſimo ſpatio: ex hoc effluxere Catamenia, per hoc etiam gravida facta fuit mulier, haud magnam vero tempore coitus percepit voluptatem; ſumma etiam Penis glans in hoc orificium vix fuit intromiſſa, multo minus ipſa virga. In hoc foramen digitum ægre introduxit Chirurgus, eo ſcilicet animo, ut ipſum uteri collum exploraret, quod tamen ne vel tactu percepit, plane autem deprehendit membranam craſſam hocce orificium ab altero inferiore, jam deſcribendo, ſeparantem.

Eo fere ipſo loco, ſuperius vero paululum, ubi in mulieribus rite conformatis adeſt foſſa magna, inventum fuit foramen alterum oblongum, ne vel minimi digiti apicem altius admittens, recto inteſtino, uti poſt partum obſervatum fuit, pervium (quod a ſectione fortaſſe accidit): nullus autem hic occurrit Sphincter: inferius vero rectum inteſtinum, more ſolito, cum Sphinctere circundato terminatur.

Orificium hoc oblongum ab orificio vaginæ, abdomine maxime tumente, duos ſaltem digitos tranverſos diſtitit, inter quæ membrana deſcripta intervenit ab interiore parte, hujuſce vero Fiſſuræ oblongæ quaſi labiorum coalitio exterius e ſuperiore foraminis parte.

Nulla hic Clitoris, hic nulla oſſium Pubis adfuere veſtigia, niſi, quaſi Apophyſes breviores ex utriuſque oſſis Ilii parte inferiore protuberantes, oſſium Pubis rudimenta dixiſſes. Hic fuit ante partum rerum ſtatus.

Die 18 Julii 1722, hora noctis 11ª advocatus est *Bonnett* Chirurgus, ut parturienti opem ferret. Perpensis omnibus, Fœtum invenit Vaginæ orificium infra dilapsum, quem muliere decumbente superiora versus propellere frustra adnixus est, ob fortissimos Fœtus motus & gravissimos Matris dolores, cui etiam jam supervenere Convulsiones, Syncope, &c. Vaginæ autem orificium vix ac ne vix quidem dilatatum, ita ut illi jam jam moriendum esse fuerit omnium expectatio.

In hoc miserrimo rerum statu, misericordia & humanitate adductus Chirurgus, posthabuit omnino, quid vel ignarum vulgus, vel invidus hic garriret aut hic: anceps experiendum esse remedium potius quam nullum apud se statuit, morte aliter citissimo ingruente pede.

Parentibus periculosissimum rerum statum enarravit, nil nisi a sectione expectandum, ancipitem prædixit eventum. Annuentibus hujus miserrimæ matre, & astantibus, in orificium oblongum inferius scalpellum chirurgicum introduxit, & uno ictu coalitionem labiorum hujusce orificii & membranam separantem divisit: hinc in unum coivere & orificium Vaginæ & oblongum inferius. Jam digitis facilis introitus, orificium Uteri internum attrectavit; dilatavit paululum, caput inde sensit infantis: quid plura? Fœtus ori intruso digito, Puellulam vivam, probe formatam, mirantibus maxime astantibus, demum extraxit, quæ & adhuc & viget & valet: uti etiam & ipsa Mater, quanquam post puerperium febre graviter colluctata est.

Jam a partu prolapsu ipsius Uteri divexatur, quo prolabente nec per horas 8, 10ve reducto, eam dein si fortius intrudas, exiliunt e meatibus urinariis descrip-

tis

tis rivuli duo ad pedis ſaltem diſtantiam; argumentum ſane Cyſtidis cujuſdam urinam excipientis: aliter revera ſuſpicaſſem meatus iſtos duos urinarios ipſorum ureterum fuiſſe orificia, hic terminantia.

Quaerat fortaſſe curioſior aliquis, quo forte modo gravida facta fuit muliercula noſtra. Illi reſponderem, Penis intruſionem ad prolem concipiendam haud abſolute eſſe neceſſariam, ſeminis autem intra vaginam ejaculationem quam maxime. *Vid. Hiſt. de l'Acad. Royale des Sciences*, 1712. *Videatur etiam Mauriceau*.

Hujus rei narrationem tibi citius tranſmiſiſſem, ni diu, fruſtra autem hactenus, mulieris alteram graviditatem expectaſſemus, quum per ſat longum tempus a puerperio cum marito cohabitaverit.

Figura 9 repreſentat mulierem gravidam.

A A Spongioſam aſſimulat quaſi carnis maſſam, quam partem fuiſſe chordæ umbilicalis autumo, magtudinis fere ovi gallinacei, tres vero digitos longam. Ex hac duo erumpunt Fiſtulæ urinariæ *b b*, quæ urinam perpetim exſtillant, nec ex ullo alio orificio redditur urina.

c Orificium Vaginæ, cloacæ galli gallinacei quam ſimillimum, ſpiſſo quaſi ſepto circumdatum: per hoc effluxere ἔμμηνα, per hoc etiam gravida facta fuit mulier. Hoc orificium, dum perpeſſa fuit mulier graviſſimos partus dolores, nullo fere modo dilatatum fuit, quanquam anus ipſe, ob vehementiſſimos muſculorum abdominis, &c. contractiones, maxime hiaret.

d Locum indicat, ubi inventum fuit foramen oblongum, minimi digiti apicem vix admittens. In hoc, tempore puerperii, Chirurgus introduxit ſcalpellum chirurgi-

cum

cum, idque ab hoc in orificium ſuperius adegit: ita ut jam a partu dehiſcat monſtroſum horrendum informe ingens foramen.

Orificium ſuperius tranſverſum ab inferiore oblongo (appropinquante partu) 2 fere digitos diſtitit. Ex hoc magno hiatu ipſius uteri prolapſum ſæpiſſime nunc patitur. Ex loco etiam, ubi adfuit olim orificium inferius, jam a puerperio, partim excretæ ſunt Fœces alvinæ: hoc vero ante partum minimè obſervatum fuit, ita ut a ſectione forte acciderit.

Orificium hoc oblongum paulo altius quam par eſt, in Figura deſignatur.

e Anum repræſentat paulo magis antrorſum quam in aliis poſitum: per hunc maxima fœcum pars egeritur. Pudendum hoc, quale quale, eſt non denſe crinitum.
